

		1病日	2病日	8病日	9病日	21病日
休薬完了	休薬完了					休薬完了
文書作成	文書	休薬完了21日目 外 103 胆道癌 GEM/CDDP がん薬物療法法の副作用についての説明書・同意書				
注射	抗がん剤	実施確認：未 点滴末梢 メイン テルモ生食 500mL 1袋 1日1回 点滴速度 250ml/h 注入時間 2時間 血管確保用 ---①		実施確認：未 点滴末梢 メイン テルモ生食 500mL 1袋 1日1回 点滴速度 250ml/h 注入時間 2時間 血管確保用 ★アプレビタント服用確認★ ---①		
		実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 100mL 1瓶 パロノセトロン静注0.75mg 5mL 1瓶 デキサメタゾン注射液3.3mg 1mL 3A 1日1回 点滴速度 216ml/h ---② 注入時間 30分 ★アプレビタント(125mg)服用確認★		実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 100mL 1瓶 パロノセトロン静注0.75mg 5mL 1瓶 デキサメタゾン注射液3.3mg 1mL 3A 1日1回 点滴速度 216ml/h ---② 注入時間 30分		
		実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚糖液5% 100mL 1瓶 ゲムシタピン点滴静注用 1000mg/g 1日1回 ★投与側の腕を温める ---③ 注入時間 30分		実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚糖液5% 100mL 1瓶 ゲムシタピン点滴静注用 1000mg/g 1日1回 ★投与側の腕を温める ---③ 注入時間 30分		
		実施確認：未 点滴末梢 メイン テルモ生食 500mL 1袋 シスプラチン注 25mg/g 1日1回 ---④ 注入時間 2時間		実施確認：未 点滴末梢 メイン テルモ生食 500mL 1袋 シスプラチン注 25mg/g 1日1回 ---④ 注入時間 2時間		
		実施確認：未 点滴末梢 メイン ラクテックG輸液 500mL 1袋 1日1回 点滴速度 250ml/h 注入時間 2時間 ---⑤		実施確認：未 点滴末梢 メイン ラクテックG輸液 500mL 1袋 1日1回 点滴速度 250ml/h 注入時間 2時間 ---⑤		
	一般注射					
処方	処方		デキサメタゾン錠 4mg 2錠 1日2回 朝食後、16時 2日分 抗がん剤点滴翌日から内服			
					デキサメタゾン錠 4mg 2錠 1日2回 朝食後、16時 2日分 抗がん剤点滴翌日から内服	
		アプレビタントカプセルセット 1セット 1日1回、1回1錠 1日目、125mgを使用 2日目以降、80mgを午前中に服用				
			アプレビタントカプセルセット 1セット 1日1回、1回1錠 1日目、125mgを使用 2日目以降、80mgを午前中に服用			
処置	処置					

□副作用への対応

- 悪心嘔吐、食欲不振 …… 食事が摂りづらい時は、食べられるもの、好きなものを少しずつでも食べる。水分を摂るようにする。
 便秘 …………… 便が出にくくなることもあるので、排便記録をつける。便秘薬が処方されている場合は早めに使用する。
 下痢 …………… 便が緩くなることもあるので、排便回数や便の性状を記録する。
 口内炎 …………… 予防のために食後の歯磨き、頻回のうがいをする。
 好中球減少 …………… 感染症予防のために外出後だけでなく自宅で過ごす時も手洗い・うがいを頻回に行う。
 脱毛 …………… 点滴後、早ければ2週間程度で髪の毛が抜け始める。帽子やウィッグを利用する。
 腎機能障害 …………… 予防のために点滴当日から3日間は1L/日の飲水を心がけてください。(シスプラチン)
 アレルギー反応 …………… 治療を繰り返すことによってアレルギー反応を起こすことがある。(シスプラチン)