

		1日目	2日目	3日目	14日目
休業完了	休業完了				休業完了
文書作成	文書	<p>休業完了14日目</p> <p>外 106 大腸癌 mFULFOX6/Bev(5mg/kg)</p> <p>がん薬物療法の副作用についての説明書・同意書</p>			
注射	抗がん剤	<p>実施確認：未</p> <p>ワンショット中心静脈 補助1側管1</p> <p>大塚生食注 20mL 1A</p> <p>1日1回</p> <p>ポート針、刺入時間確認</p> <p>---①</p>			
		<p>実施確認：未</p> <p>中心静脈 メイン</p> <p>大塚生食注 100mL 1瓶</p> <p>1日1回</p> <p>---②</p> <p>ルート確保用</p>			
		<p>実施確認：未</p> <p>点滴中心静脈 メイン 側管1</p> <p>大塚生食注 100mL 1瓶</p> <p>パロノセトロン静注0.75mg 5mL 1瓶</p> <p>デキサメタゾン注射液3.3mg 1mL 3A</p> <p>1日1回</p> <p>点滴速度 216ml/h</p> <p>注入時間 30分</p> <p>---③</p> <p>ルートは後でレボホリナート投与に使用</p>			
		<p>実施確認：未</p> <p>中心静脈 (埋込型カテーテル使用)</p> <p>大塚生食注 100mL 1瓶</p> <p>ペバシズマブ点滴静注用 5mg/kg</p> <p>1日1回</p> <p>★初回90分、2回目60分、それ以降30分に変更可能</p> <p>---④</p> <p>注入時間 1時間30分</p>			
		<p>実施確認：未</p> <p>中心静脈 メイン</p> <p>大塚糖液 5%250mL 1袋</p> <p>オキサリプラチン注 85mg/m<sup>2</sup></p> <p>1日1回</p> <p>注入時間 2時間</p> <p>レボホリナートと同時に投与</p> <p>---⑤</p>			
		<p>実施確認：未</p> <p>点滴中心静脈 メイン 側管1</p> <p>大塚糖液 5%250mL 1袋</p> <p>レボホリナート点滴静注用 200mg/m<sup>2</sup></p> <p>1日1回</p> <p>注入時間 2時間</p> <p>オキサリプラチン注と同時に投与</p> <p>---⑥</p>			
		<p>実施確認：未</p> <p>点滴中心静脈 メイン 側管1</p> <p>大塚生食注 50mL 1瓶</p> <p>フルオロウラシル注 400mg/m<sup>2</sup></p> <p>1日1回</p> <p>注入時間 5分</p> <p>急速投与</p> <p>---⑦</p>			
		<p>実施確認：未</p> <p>中心静脈 メイン</p> <p>大塚生食注 20mL 20mL</p> <p>フルオロウラシル注 2400mg/m<sup>2</sup></p> <p>1日1回</p> <p>注入時間 46時間</p> <p>---⑧</p> <p>インフューザーポンプ</p> <p>★7/14の投与量別希釈表参照★</p>			
	携帯ポンプ				
一般注射				ワンショット中心静脈 補助1側管1	大塚生食注 20mL 1A

□副作用への対応

- 悪心嘔吐 食欲不振 …… 食事が摂りづらい時は、食べられるもの、好きなものを少しずつでも食べる。水分を摂るようにする。
- 便秘 …… 便が出にくくなることもあるので、排便記録をつける。便秘薬が処方されている場合は早めに使用する。
- 下痢 …… 便が緩くなることもあるので、排便回数や便の性状を記録する。
- 口内炎 …… 予防のために食後の歯磨き、頻回のがいをする。
- 好中球減少 …… 感染症予防のために外出だけでなく自宅で過ごす時も手洗いうがいを頻回に行う。
- 脱毛 …… 点滴後、早ければ2週間程度で髪の毛が抜け始める。帽子やウィッグを利用する。
- 高血圧 …… 血圧が上昇する可能性があるため家庭血圧を記録する。(ペバシズマブ)
- タンパク尿 …… 定期的に尿検査を行う。(ペバシズマブ)
- 鼻血 …… 強く鼻をかんだり触ったりしない。鼻血はほとんどの場合は軽度で、安静にしていれば止まる。(ペバシズマブ)
- 末梢神経障害 …… 冷感刺激を避けること(特に点滴後5日間程度) 治療を繰り返すことにより手足がしびれることがある。痛みを伴う場合は痛み止めを使うことがある。(オキサリプラチン)
- アレルギー反応 …… 治療を繰り返すことによりアレルギー反応を起こすことがある。(オキサリプラチン)