

		1病日	21病日
休薬完了	休薬完了		休薬完了
文書作成	文書	休薬完了21日目	
		内 128 肺癌／中皮腫 ペメトレキセド	
		がん薬物療法の副作用についての説明書・同意書	
注射	抗がん剤	実施確認：未 持続末梢インフ [®] グラニセトロン点滴静注バッグ3mg／100mL 1袋 デキサメタゾン注射液3. 3mg 1mL 2A 1日1回 点滴速度 204ml/h 注入時間 30分 ---①	
		実施確認：未 持続末梢インフ [®] 大塚生食注 100mL 1瓶 ペメトレキセド注射用 500mg/m ² 1日1回 注入時間 10分 ---②	
		実施確認：未 持続末梢インフ [®] 大塚生食注 50mL 1瓶 1日1回 点滴速度 600ml/h 注入時間 5分 ---③	
	一般注射	ビタミンB12製剤/9W (im)	
処方	処方	葉酸製剤 連日内服	

副作用への対応

- 悪心嘔吐、食欲不振 …… 食事が摂りづらい時は、食べられるもの、好きなものを少しずつでも食べる。水分を摂るようにする。
- 便秘 …… 便が出にくくなることがあるので、排便記録をつける。便秘薬が処方されている場合は早めに使用する。
- 下痢 …… 便が緩くなることがあるので、排便回数や便の性状を記録する。
- 口内炎 …… 予防のために食後の歯磨き、頻回のうがいをする。
- 好中球減少 …… 感染症予防のために外出後だけでなく自宅で過ごす時も手洗いうがいを頻回に行う。
- 脱毛 …… 点滴後、早ければ2週間程度で髪の毛が抜け始める。帽子やウィッグを利用する。