

		1病日	7病日
休薬完了	休薬完了		休薬完了
文書作成	文書	休薬完了7日目	
		外 164 乳癌 Weekly PTX (12weeks)	
		がん薬物療法の副作用についての説明書・同意書	
		アルコール過敏症確認	
		12週連続投与	
注射	抗がん剤	実施確認：未 点滴末梢 メイン グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL 1袋 ファモチジン注射液20mg 2mL 1A デキサメタゾン注射液3.3mg 1mL 2A 1日1回 点滴速度 208ml/h 注入時間 30分 ---① ↓ ★パル輸液セット使用★ ★ジフェンヒドラミン内服確認★	
		実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 250mL 1袋 パクリタキセル注 80mg/m ² 1日1回 ★パル輸液セット使用★ 注入時間 1時間 ---②	
		実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 50mL 1瓶 1日1回 点滴速度 500ml/h 注入時間 6分 ---③	
	一般注射		
処方	処方	ジフェンヒドラミン錠10mg 5錠 血管確保前に服用	

□副作用への対応

- 悪心嘔吐、食欲不振 …… 食事が摂りづらい時は、食べられるもの、好きなものを少しずつでも食べる。水分を摂るようにする。
- 便秘 …… 便が出にくくなることがあるので、排便記録をつける。便秘薬が処方されている場合は早めに使用する。
- 下痢 …… 便が緩くなることがあるので、排便回数や便の性状を記録する。
- 口内炎 …… 予防のために食後の歯磨き、頻回のうがいをする。
- 好中球減少 …… 感染症予防のために外出後だけでなく自宅でも手洗い・うがいを頻回に行う。
- 脱毛 …… 点滴後、早ければ2週間程度で髪の毛が抜け始める。帽子やウィッグを利用する。
- 末梢神経障害 …… 治療を繰り返すことによって手足がしびれることがある。(パクリタキセル)
- 関節痛・筋肉痛 …… 点滴後、関節痛や筋肉痛を感じることもある。痛みが強い場合は鎮痛剤を使うこともある。(パクリタキセル)