

		1病日	7病日
休薬完了	休薬完了		休薬完了
文書作成	文書	📄 休薬完了7日目	
		耳鼻 6 頭頸部癌 Cetuximab+RT (2回目以降)	
		がん薬物療法の副作用についての説明書・同意書	
注射	抗がん剤	実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 100mL 1瓶 デキサメタゾン注射液3. 3mg 1mL 2A d-クルルフェニラミン注5mg 1mL 1A 1日1回 点滴速度 206ml/h 注入時間 30分 ---①	
		実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 250mL 1袋 セツキシマブ注射液 250mg/m ² 1日1回 注入時間 1時間 ---②	
		実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 100mL 1瓶 1日1回 点滴速度 400ml/h ★投与後、1時間は観察を十分に… 注入時間 15分 ---③	
	一般注射		
処方	処方	ミノサイクリン塩酸塩錠 50mg 2錠 1日2回 朝・夕食後 14日分	⇒
		ヘパリン類似物質クリーム0.3% 20g 2本 ぬり薬 1日2回 部位体 保湿剤として	
		ヒドロコルチゾン酪酸エステルクリーム0.1% 5g 1本 ぬり薬 1日2回 部位：顔	
		ジフルプレドナート軟膏0.05% 5g 1本 ぬり薬 1日2回 部位：体・手足	
		📄 ミノサイクリンは6週間服用	

□副作用への対応

皮膚乾燥 …… 治療が進むにつれて乾燥と掻痒感が強くなる可能性があるため、開始と同時に保湿剤を使用して保湿を開始する。(セツキシマブ)
 にきび様さ瘡 …… 顔や前胸部などに皮疹が出現するので、出現時には部位に応じたステロイド軟膏を保湿剤を塗布した上から塗布する。(セツキシマブ)
 電解質異常 …… 血液中のマグネシウム低下に伴って、動悸などが発現する可能性がある。(セツキシマブ)