

		1病日	14病日
休薬完了	休薬完了		休薬完了
文書作成	文書	休薬完了14日目	
		内 70 肺癌 CBDCA/CPT-11	
		がん薬物療法の副作用についての説明書・同意書	
注射	抗がん剤	実施確認：未 持続末梢メインツ 大塚生食注 100mL 1瓶 パロノセトロン静注0.75mg 5mL 1瓶 デキサメタゾン注射液3.3mg 1mL 1A 1日1回 点滴速度 212ml/h 注入時間 30分 ――① ★アプレビタント125mg服用確認	
		実施確認：未 持続末梢メインツ 大塚糖液5% 500mL 1袋 イリノテカン点滴静注 60mg/m <sup>2</sup> 1日1回 注入時間 2時間 ――②	
		実施確認：未 持続末梢メインツ 大塚生食注 250mL 1袋 カルボプラチン点滴静注 AUC=2 1日1回 注入時間 1時間 ――③	
		実施確認：未 持続末梢メインツ 大塚生食注 50mL 1瓶 1日1回 点滴速度 600ml/h 注入時間 5分 ――④	
	一般注射		
処方	処方	アプレビタントカプセルセット 1セット 1日1回、1回1錠 1日目、125mgを使用 2日目以降、80mgを午前中に服用	

#### □副作用への対応

- 悪心嘔吐、食欲不振 …… 食事が摂りづらい時は、食べられるもの、好きなものを少しずつでも食べる。水分を摂るようにする。
- 便秘 …… 便が出にくくなることがあるので、排便記録をつける。便秘薬が処方されている場合は早めに使用する。
- 下痢 …… 便が緩くなることもあるので、排便回数や便の性状を記録する。
- 口内炎 …… 予防のために食後の歯磨き、頻回のうがいをする。
- 好中球減少 …… 感染症予防のために外出後だけでなく自宅で過ごす時も手洗い・うがいを頻回に行う。
- 脱毛 …… 点滴後、早ければ2週間程度で髪の毛が抜け始める。帽子やウィッグを利用する。
- アレルギー反応 …… 治療を繰り返すことによってアレルギー反応を起こすことがある。(カルボプラチン)