

		1病日	2病日	21病日
休薬完了	休薬完了			休薬完了
文書作成	文書	★3~4W毎に繰り返し 休薬完了21日目		
		泌尿器科 PC-1 前立腺癌 ドセタキセル		
		がん薬物療法の副作用についての説明書・同意書		
注射	抗がん剤	実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 100mL 1瓶 デキサメタゾン注射液3.3mg 1mL 2A ラモセトロン塩酸塩注射液0.3mg 2mL 1A 1日1回 点滴速度 208ml/h 注入時間 30分 ---①		
		実施確認：未 持続末梢メインツブ 大塚生食注 250mL 1袋 ドセタキセル点滴静注 50mg/m ² 1日1回 注入時間 1時間 ---②		
		実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 50mL 1瓶 1日1回 点滴速度 600ml/h 注入時間 5分 ---③		
	一般注射			
処方	処方		デキサメタゾン錠 4mg 2錠 1日2回 朝食後、16時 2日分 抗がん剤点滴翌日より内服	

□副作用への対応

- 悪心嘔吐、食欲不振 …… 食事が摂りづらい時は、食べられるもの、好きなものを少しずつでも食べる。水分を摂るようにする。
- 便秘 …… 便が出にくくなることもあるので、排便記録をつける。便秘薬が処方されている場合は早めに使用する。
- 下痢 …… 便が緩くなることもあるので、排便回数や便の性状を記録する。
- 口内炎 …… 予防のために食後の歯磨き、頻回のうがいをする。
- 好中球減少 …… 感染症予防のために外出後だけでなく自宅で過ごす時も手洗い・うがいを頻回に行う。
- 脱毛 …… 点滴後、早ければ2週間程度で髪の毛が抜け始める。帽子やウィッグを利用する。
- 爪の変形 …… 繰り返し点滴することにより爪の変形や変色が起こることがある。清潔に保ち、強い力をかけないようにする。(ドセタキセル)
- 浮腫 …… 繰り返し点滴することにより顔や足に浮腫が起こることがある。(ドセタキセル)